

# Surveillance d'un patient en post chimiothérapie à domicile

FICHE  
SOIGNANTS

Patients traités en hématologie-oncologie pédiatrique

Items à vérifier, cocher et tracer à chaque passage

NOM :

Date :

Simple  
traçabilitéSoignants du  
domicile et  
parents prévenusMédecin référent  
appeléHospitalisation  
de l'enfant  
en cours

ÉLÉMENTS de SURVEILLANCE	NORMAL	VIGILANCE	PRÉVENIR le MÉDECIN	HOSPITALISATION
T° axillaire corrigée	36°8 < T° < 38°0C	> ou = à 38°C une fois, < 36°8 Sueurs	>38,5° C une fois ou >38°C deux fois à 1h d'intervalle Frissons	>38,5° C ou >38°C deux fois à 1h d'intervalle en aplasie
Cathéter	Peau autour du point d'entrée normale et non douloureuse	Peau rouge	Sensible Douloureux	Présence de pus Saignement Nécrose
Mucite (Évaluation avec lampe de poche)	Muqueuse rosée Alimentation habituelle non douloureuse	Érythème ou lésion muqueuse peu de douleur	Ulcérations muqueuses mais possibilité de manger solide	Alimentation impossible
Anite	Pas d'anite	Inflammation locale	Fissure avec douleurs	Cellulite
Toxicité cutanée	Peau normale pas de douleur ou de prurit	Érythème Desquamation sèche	Vésicules Prurit	Ulcérations Érythème étendu Nécrose
Nausées, Vomissements	Absence de nausées et vomissement	Nausées Vomissements transitoires (1 à 2 /jr)	Vomissements (>2)	Vomissements incoercibles Déshydratation
Constipation	Absence	Minime à modérée	Douleurs supérieures à 3 jrs	Sub-occlusion / Occlusion : vomisse- ments, douleurs
Diarrhée	Transit habituel	> 3 / jour	> 4 / jours avec difficultés alimentaires	> 6 / jrs de déshydratation Diarrhée hémorragique Anorexie Vomissements
Douleur (EVA ou échelle d'hétéroévaluation)	Absence	Faible	Modérée sans interférence avec la vie quotidienne	Modérée, interfère avec la vie quotidienne malgré traitement
Saignement	Aucun signe	Purpura, Ecchymoses Epistaxis cédant spontanément		Hémorragies des muqueuses (gencives, urines, selles) Saignement autre intarissable
Troubles urinaires	Diurèse normale			Sang dans les urines Dysurie Anurie
Neuropathie périphérique	Aucun signe	Paresthésies modérées	Paresthésies sévères et / ou faiblesse musculaire	Paresthésies intolérables Trouble de la marche
Céphalées	Absentes	Légères sans nécessité de garder le lit		Intenses avec photophobie ou / et vomissements