

Médicament	Où le trouver ?	Conservation	Comment le prendre ?	Précautions Surveillance	Médicament	Où le trouver ?	Conservation	Comment le prendre ?	Précautions Surveillance
<p><b>GLIVEC (Imatinib)</b></p> <p>- Comprimé rond jaune très foncé, dosé à 100 mg</p>  <p>- Comprimé ovoïde jaune très foncé dosé à 400 mg</p> 	<p>- Prescription par un spécialiste à l'hôpital</p> <p>- Pharmacie de ville</p> <p>- Dans le cadre de l'HAD, les traitements vous sont fournis</p>	<p>- Température ambiante &lt; 30°C</p> <p>- À l'abri de l'humidité</p>	<p>À prendre au cours des repas, en une prise par jour.</p> <p>En cas de problème pour avaler, le comprimé peut être dispersé dans un volume suffisant d'eau ou de jus de pomme. Pas de jus d'orange ni pamplemousse.</p> <p>Environ 50 ml pour un comprimé à 100mg et 200ml pour un comprimé à 400 mg.</p>	<p>Éviter l'exposition au soleil</p>	<p><b>GLIVEC (Imatinib)</b></p> <p>- Comprimé rond jaune très foncé, dosé à 100 mg</p>  <p>- Comprimé ovoïde jaune très foncé dosé à 400 mg</p> 	<p>- Prescription par un spécialiste à l'hôpital</p> <p>- Pharmacie de ville</p> <p>- Dans le cadre de l'HAD, les traitements vous sont fournis</p>	<p>- Température ambiante &lt; 30°C</p> <p>- À l'abri de l'humidité</p>	<p>À prendre au cours des repas, en une prise par jour.</p> <p>En cas de problème pour avaler, le comprimé peut être dispersé dans un volume suffisant d'eau ou de jus de pomme. Pas de jus d'orange ni pamplemousse.</p> <p>Environ 50 ml pour un comprimé à 100mg et 200ml pour un comprimé à 400 mg.</p>	<p>Éviter l'exposition au soleil</p>

Médicament	Où le trouver ?	Conservation	Comment le prendre ?	Précautions Surveillance	Médicament	Où le trouver ?	Conservation	Comment le prendre ?	Précautions Surveillance
<p><b>GLIVEC (Imatinib)</b></p> <p>- Comprimé rond jaune très foncé, dosé à 100 mg</p>  <p>- Comprimé ovoïde jaune très foncé dosé à 400 mg</p> 	<p>- Prescription par un spécialiste à l'hôpital</p> <p>- Pharmacie de ville</p> <p>- Dans le cadre de l'HAD, les traitements vous sont fournis</p>	<p>- Température ambiante &lt; 30°C</p> <p>- À l'abri de l'humidité</p>	<p>À prendre au cours des repas, en une prise par jour.</p> <p>En cas de problème pour avaler, le comprimé peut être dispersé dans un volume suffisant d'eau ou de jus de pomme. Pas de jus d'orange ni pamplemousse.</p> <p>Environ 50 ml pour un comprimé à 100mg et 200ml pour un comprimé à 400 mg.</p>	<p>Éviter l'exposition au soleil</p>	<p><b>GLIVEC (Imatinib)</b></p> <p>- Comprimé rond jaune très foncé, dosé à 100 mg</p>  <p>- Comprimé ovoïde jaune très foncé dosé à 400 mg</p> 	<p>- Prescription par un spécialiste à l'hôpital</p> <p>- Pharmacie de ville</p> <p>- Dans le cadre de l'HAD, les traitements vous sont fournis</p>	<p>- Température ambiante &lt; 30°C</p> <p>- À l'abri de l'humidité</p>	<p>À prendre au cours des repas, en une prise par jour.</p> <p>En cas de problème pour avaler, le comprimé peut être dispersé dans un volume suffisant d'eau ou de jus de pomme. Pas de jus d'orange ni pamplemousse.</p> <p>Environ 50 ml pour un comprimé à 100mg et 200ml pour un comprimé à 400 mg.</p>	<p>Éviter l'exposition au soleil</p>