

Vomissements lors de la prise d'un traitement oral

Patients traités en hématologie-oncologie pédiatrique

CONSEILS GÉNÉRAUX

- Absorber le comprimé ou la gélule avec le minimum d'eau
- Utiliser la forme lyoc si l'enfant le peut ou éventuellement le diluer avec un peu d'eau
- Lors de vomissements réitérés, penser à des causes physiopathologiques et consulter le médecin (gastroentérite, évolution méningée ...).

QUE FAIRE ?

Si vomissement immédiat ou rapide après la prise, vérifier la présence ou l'absence de la gélule ou du comprimé dans le rendu de l'enfant.

- Si présence du médicament : en redonner un autre
- **SINON :**

TRAITEMENT DE FOND

SPÉCIALITÉS		RECOMMANDATIONS
ANTICANCÉREUX	LANVIS®, TÉMODAL®, PURINÉTHOL®, CELLTOP®, ETOPOSIDE®, NAVELBINE®, METHOTREXATE, GLIVEC®, ETC...	<ul style="list-style-type: none"> • Ne pas reprendre le médicament • Attendre la prise suivante et ne jamais la doubler • CONTACTER LE MEDECIN
CORTICOÏDES		<ul style="list-style-type: none"> • Vomissement dans les 30 minutes après la prise : reprise de la dose habituelle • Vomissement au-delà de 30 minutes après la prise : ne pas reprendre le médicament, attendre la prise suivante et ne jamais la doubler • CONTACTER LE MÉDECIN
IMMUNOSUPPRESSEURS	NEORAL®	<ul style="list-style-type: none"> • Vomissement dans les 30 minutes après la prise : reprise de la dose habituelle • Vomissement au-delà de 30 minutes après la prise : ne pas reprendre le médicament, attendre la prise suivante et ne jamais la doubler • CONTACTER LE MÉDECIN

Vomissements lors de la prise d'un traitement oral

Patients traités en hématologie-oncologie pédiatrique

TRAITEMENT ASSOCIÉ

SPÉCIALITÉS		RECOMMANDATIONS
ANTIÉMÉTIQUES	KYTRIL® , ZOPHREN® (hors forme lyoc)	<ul style="list-style-type: none"> Vomissement dans les 30 minutes après la prise : reprise de la dose habituelle Vomissement au-delà de 30 minutes après la prise : ne pas reprendre le médicament, attendre la prise suivante et ne jamais la doubler
	EMEND®	<ul style="list-style-type: none"> Vomissement dans les 30 minutes après le prise : reprise de la dose habituelle Vomissement au-delà de 30 minutes après la prise : ne pas reprendre le médicament, attendre la prise suivante et ne jamais la doubler
	PLITICAN®	<ul style="list-style-type: none"> Ne pas reprendre le médicament Attendre la prise suivante et ne jamais la doubler
ANXIOLYTIQUES	ATARAX®	<ul style="list-style-type: none"> Vomissement dans les 30 minutes après la prise : reprise de la dose habituelle Vomissement au-delà de 30 minutes après la prise : ne pas reprendre le médicament, attendre la prise suivante et ne jamais la doubler
ANTALGIQUES		<ul style="list-style-type: none"> Pour les formes à libération prolongée : ne pas reprendre et réévaluer 3 heures après. Pour les formes à libération immédiate : réévaluer 1h après le vomissement. Si persistance de la douleur, reprise d'une dose possible
ANTIBIOTIQUES	En prophylaxie BACTRIM®	<ul style="list-style-type: none"> Reprise 12h après, sauf la veille de la prise du Méthotrexate®
	En curatif	CONTACTER LE MÉDECIN

Les auteurs déclarent n'avoir aucun conflit d'intérêt avec des établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou des organismes intervenant sur ces produits.