

Exposition à un produit de chimiothérapie au domicile

Patients traités en hématologie-oncologie pédiatrique

RAPPELS En cas d'incident, toujours penser à :

• **ISOLER LA ZONE CONTAMINÉE :**

- Faire évacuer la pièce, en évitant les mouvements d'air
- Fermer les portes et les fenêtres
- Si nécessaire arrêter la ventilation, la climatisation, etc...

• **S'HABILLER AVEC :**

- une surblouse propre
- une charlotte, un masque, des lunettes de protection
- 2 paires de gants (ménage au dessus), en veillant à ce qu'ils recouvrent la blouse
- des surchaussures

RECOMMANDATIONS SELON L'INCIDENT RENCONTRÉ

<ul style="list-style-type: none"> • FUITE DE LA PRÉPARATION • BRIS DE FLACON • ÉCRASEMENT OU OUVERTURE ACCIDENTELLE DE COMPRIMÉ OU GÉLULE 	<p>SI LIQUIDE :</p> <ul style="list-style-type: none"> • absorber avec la ouate ou le papier absorbant, en ramenant le liquide de la périphérie vers le centre de la souillure • si présence de morceaux de verre, les ramasser avec une fiche cartonnée type bristol et les jeter dans le conteneur à aiguilles • ou asperger de poudre gélifiante (kit) et racler avec la fiche bristol et la pelle <p>SI POUDRE :</p> <ul style="list-style-type: none"> • humidifier la ouate à l'eau pour éviter la dispersion de la poudre, et ramasser en ramenant vers le centre • si présence de morceaux de verre, les ramasser avec une fiche cartonnée type bristol et les jeter dans le conteneur à aiguilles <p>DANS TOUS LES CAS :</p> <ul style="list-style-type: none"> • changer de chiffonnettes autant de fois que nécessaire • ne pas frotter ni brosser • rincer abondamment la zone à l'eau (au moins 3 fois), essuyer • jeter les déchets dans le sac poubelle jaune : les sopalins, ouates, bristols ayant servi au nettoyage, surblouse, gants, surchaussures, charlotte, etc. • la zone contaminée sera à nouveau nettoyée avec un détergent, les éléments de nettoyage jetés dans un sac jaune si possible • ne pas utiliser de l'eau de javel • informer le prescripteur de l'incident et évaluer avec lui la nécessité d'une nouvelle prise du traitement
--	--

Les auteurs déclarent n'avoir aucun conflit d'intérêt avec des établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou des organismes intervenant sur ces produits.

Exposition à un produit de chimiothérapie au domicile

Patients traités en hématologie-oncologie pédiatrique

<ul style="list-style-type: none"> • PIQÛRE • BLESSURE • COUPURE 	<ul style="list-style-type: none"> • Rincer abondamment à l'eau courante pendant 15 minutes • Nettoyer au savon doux et rincer • Consulter le médecin du travail ou des urgences. Voir si besoin la procédure d'extravasation en fonction du produit et/ou de la plaie • Faire une déclaration d'accident du travail • Si blessure par une aiguille ayant été en contact avec les liquides biologiques du patient, appliquer la procédure d'accident d'exposition au sang
<ul style="list-style-type: none"> • PROJECTION CUTANÉE 	<ul style="list-style-type: none"> • Rincer abondamment à l'eau courante pendant 15 minutes • Nettoyer au savon doux et rincer • Si présence d'une sensation de brûlure, appliquer une pommade type « Cold cream » • Consulter le médecin du travail • Faire une déclaration d'accident du travail
<ul style="list-style-type: none"> • PROJECTION OCULAIRE 	<ul style="list-style-type: none"> • Si port de lentilles de contact, les retirer immédiatement et les jeter • Laver immédiatement l'oeil atteint avec une solution stérile de chlorure de sodium 0,9% (sérum physiologique), ou eau stérile ou à défaut eau du robinet au moins 5 min • Consultation en urgence d'un médecin ophtalmologue • Consulter le médecin du travail • Faire une déclaration d'accident du travail
<ul style="list-style-type: none"> • PROJECTION VESTIMENTAIRE 	<ul style="list-style-type: none"> • NE PAS CIRCULER AVEC LES VÊTEMENTS SOUILLÉS : se faire fournir une tenue propre de rechange • Ôter les vêtements souillés lentement, en les roulant de façon à ne pas étendre la contamination • Mettre 2 paires de gants (ménage au-dessus) • Placer les vêtements jetables dans le sac poubelle jaune, les vêtements tissus dans un sac poubelle étiqueté linge contaminé • Laver 2 fois en machine le linge contaminé, seul avec du détergent sur un cycle long. Dans le cas d'un sac poubelle ordinaire, il sera lui-même jeté dans le sac jaune après la mise en machine du linge souillé • En cas de pénétration jusqu'à la peau, appliquer la procédure projection cutanée

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

HABILLAGE

- surblouse manche longues serrées aux poignets
- masque FFP2 UU
- charlotte UU
- surchaussures UU étanches (1 paire)
- lunettes de protection
- une paire de gants nitrile
- une paire de gants de ménage

NETTOYAGE

- Ouate de cellulose ou papier absorbant
- Flacon de poudre gélifiante ou farine
- Flacon eau > 250ml
- Douchette pour lavage oculaire ou poche de sérum physiologique + tubulure
- 2 fiches cartonnées type bristol
- Sac poubelle jaune, collecteur à aiguille

ÉVACUATION DES DÉCHETS

- Par l'infirmière : sac poubelle jaune et son contenu, collecteur à aiguille
- Dépôt à la pharmacie si accident en l'absence de l'infirmière