

Médicament	Où le trouver ?	Conservation	Comment le prendre ?	Précautions Surveillance	Médicament	Où le trouver ?	Conservation	Comment le prendre ?	Précautions Surveillance
ZAVEDOS (Idarubicine) - Gélule orange dosée à 5 mg  - Gélule blanche et orange dosée à 10 mg 	- Prescription par un spécialiste à l'hôpital - Pharmacie de ville - Dans le cadre de l'HAD, les traitements vous sont fournis	- Température ambiante < 25°C - À l'abri de la lumière, de la chaleur et de l'humidité	À prendre en 1 prise, directement à partir du flacon au cours d'un repas léger avec de l'eau, sans les sucer, ni les mâcher, ni les mordre.	- À prendre soit une fois par semaine, soit pendant 3 jours consécutifs selon le protocole. - En cas de contact avec la peau : laver à l'eau et au savon, puis rincer avec une solution de Bicarbonate de sodium.	ZAVEDOS (Idarubicine) - Gélule orange dosée à 5 mg  - Gélule blanche et orange dosée à 10 mg 	- Prescription par un spécialiste à l'hôpital - Pharmacie de ville - Dans le cadre de l'HAD, les traitements vous sont fournis	- Température ambiante < 25°C - À l'abri de la lumière, de la chaleur et de l'humidité	À prendre en 1 prise, directement à partir du flacon au cours d'un repas léger avec de l'eau, sans les sucer, ni les mâcher, ni les mordre.	- À prendre soit une fois par semaine, soit pendant 3 jours consécutifs selon le protocole. - En cas de contact avec la peau : laver à l'eau et au savon, puis rincer avec une solution de Bicarbonate de sodium.

Médicament	Où le trouver ?	Conservation	Comment le prendre ?	Précautions Surveillance	Médicament	Où le trouver ?	Conservation	Comment le prendre ?	Précautions Surveillance
ZAVEDOS (Idarubicine) - Gélule orange dosée à 5 mg  - Gélule blanche et orange dosée à 10 mg 	- Prescription par un spécialiste à l'hôpital - Pharmacie de ville - Dans le cadre de l'HAD, les traitements vous sont fournis	- Température ambiante < 25°C - À l'abri de la lumière, de la chaleur et de l'humidité	À prendre en 1 prise, directement à partir du flacon au cours d'un repas léger avec de l'eau, sans les sucer, ni les mâcher, ni les mordre.	- À prendre soit une fois par semaine, soit pendant 3 jours consécutifs selon le protocole. - En cas de contact avec la peau : laver à l'eau et au savon, puis rincer avec une solution de Bicarbonate de sodium.	ZAVEDOS (Idarubicine) - Gélule orange dosée à 5 mg  - Gélule blanche et orange dosée à 10 mg 	- Prescription par un spécialiste à l'hôpital - Pharmacie de ville - Dans le cadre de l'HAD, les traitements vous sont fournis	- Température ambiante < 25°C - À l'abri de la lumière, de la chaleur et de l'humidité	À prendre en 1 prise, directement à partir du flacon au cours d'un repas léger avec de l'eau, sans les sucer, ni les mâcher, ni les mordre.	- À prendre soit une fois par semaine, soit pendant 3 jours consécutifs selon le protocole. - En cas de contact avec la peau : laver à l'eau et au savon, puis rincer avec une solution de Bicarbonate de sodium.