

Aracytine® 100 mg

sous-cutanée à domicile dans le protocole Fralle 2000

Patients traités en hématologie-oncologie pédiatrique

CE DOCUMENT DONNE LES RÈGLES POUR L'EXÉCUTION DE LA PRESCRIPTION D'UN PRODUIT DE CHIMIOTHÉRAPIE NON MUTAGÈNE DISPONIBLE EN PHARMACIE DE VILLE ET ADMINISTRÉ À DOMICILE DANS LE CADRE DU TRAITEMENT D'UNE LEUCÉMIE AIGUË LYMPHOBLASTIQUE DE L'ENFANT.

PRINCIPES GÉNÉRAUX

- **INJECTION SOUS-CUTANÉE (S-C)** dans le cadre du protocole Fralle 2000
- **OK CHIMIO** : s'assurer que le « ok chimio » ait bien été donné dans la journée de la première injection chaque semaine.
- **3 SÉRIES DE 4 INJECTIONS S-C À 12H D'INTERVALLE** (une série / semaine pendant 3 semaines).
- **PATCH D'EMLA** : s'assurer qu'il ait été bien posé par les parents sur le site d'injection au moins 1h avant.
- **VARIER LES SITES À CHAQUE INJECTION** : cuisse, quart supéro-externe de la fesse, ventre, haut du bras.
- **1 ORDONNANCE / SEMAINE**

MATÉRIEL

• MATÉRIEL DE PRÉPARATION

- Aracytine® (ou Cytarabine) 100mg poudre pour solution injectable.

! NE PAS UTILISER LE SOLVANT

- NaCl 0,9% à la place du solvant

- 1 seringue de 1ml pour l'injection
- 1 seringue de 10ml pour la préparation
- 2 aiguilles 18G (trocart)
- 1 aiguille s-c pour l'injection
- si prescrit : Xylocaïne® (Lidocaïne) 1%, flacon de 20ml
- champ de soin
- SHA (Solution Hydro Alcoolique)
- essuie-main



• MATÉRIEL D'HABILLAGE

- 1 masque, 1 charlotte, 1 surblouse à usage unique
- 2 paires de gants non stériles : 1 paire l'une sur l'autre
- lunettes de protection (à garder d'une fois sur l'autre)

Aracytine® 100 mg

sous-cutanée à domicile

dans le protocole Fralle 2000

Patients traités en hématologie-oncologie pédiatrique

PRÉPARATION

- **LAVAGE DES MAINS**
- **HABILLAGE**
- **INSTALLATION DE LA ZONE DE TRAVAIL** : au domicile, choisir un plan propre, stable et ergonomique si possible pour installer le champ stérile.
- **RECONSTITUTION DE L'ARACYTINE®**
 - Faire une friction des mains avec de la SHA, puis enfiler les 2 paires de gants.
 - Retirer le Flip Off du flacon et désinfecter le bouchon.
 - Prélever 2ml de NaCl 0,9%; les rajouter à la poudre d'Aracytine®. Remuer délicatement le flacon.
 - Prélever le volume d'Aracytine® prescrit et détaillé sur l'ordonnance.
 - **Si prescription de Xylocaïne®** : en rajouter 0,1 ml dans la seringue d'Aracytine®.



Garder une compresse lors du prélèvement de l'Aracytine® reconstitué pour éviter les projections.



La quantité à injecter n'est jamais supérieure à 1,2ml

DÉROULEMENT DU SOIN

- **FRICTION DES MAINS** avec de la SHA.
- **ENLEVER LE PATCH** et désinfecter la peau.
- **INJECTION EN SOUS-CUTANÉE**, lente.
- **TRAÇABILITÉ**
 - Noter le soin dans le classeur de liaison Rifhop.
 - Noter le n° du lot du flacon d'Aracytine® utilisé et la date de péremption.

Transmissions		
Date & heure	Transmissions des médecins & infirmières	Nom, fonction structure

GESTION DES DÉCHETS

- **FLACONS AVEC RESTES D'ARACYTINE®**
Ils doivent être stockés à part dans le petit container et remis à l'hôpital par les parents.
- **MATÉRIEL SOUILLÉ (SERINGUES, AIGUILLES)**
Elles sont éliminées dans le circuit classique (grand bac jaune mis à disposition).

SURVEILLANCE DES EFFETS SECONDAIRES

- Peu fréquents
- Fièvre, nausée, inflammation au point de ponction : les noter et les signaler au médecin référent.

Les auteurs déclarent n'avoir aucun conflit d'intérêt avec des établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou des organismes intervenant sur ces produits.